

STOP THE FIRE ANT

ヒアリの侵入及び定着の防止のためにご協力を！

ヒアリは、6月に兵庫県尼崎市で確認されて以降、現在までに各地で相次いで確認されており、わが国への侵入及び定着が懸念される状況となっております。

特徴

赤茶色の小型のアリで、腹部は刻黒っぽい赤色。体長は2.5mm～6mm。土でアリ塚を作って住む。毒性が強く、お尻の毒針で刺されるとアレルギー反応により死に至る。人体への被害等を及ぼすことから外来生物法により「特定外来生物」に指定。

駆除方法

ヒアリを発見したら地方環境事務所等に通報を！

熱湯

即応性○ 実効性×

- ・熱湯を巣穴とその周辺に注ぐ。
- ・アリ塚の深部にいるヒアリは駆除できない。

液剤

即応性○ 実効性△

- ・巣に直接散布する。
- ・市販の殺虫剤でも処理できるが、専門業者による高圧散布の方が高い効果がある。

ベイト剤

即応性△ 実効性○

- ・ゼリー状のベイト剤（毒餌）をヒアリの行列内や巣の周辺に設置する。
- ・時間は要するものの働きアリが巣に持ち帰ることにより巣の内部まで駆除が可能。

刺された場合

安静にし、急激な容体の変化が現れたらすぐに病院へ！

症状

●軽度/刺された部位の痛みやかゆみ

刺された瞬間は熱いと感じるような、激しい痛みが走る。やがて、刺された痕が痒くなり、10時間ほど経つと膿ができる。

●中度/じんましん

刺されて数分から数十分後には刺された部分を中心に腫れが広がり、部分的、または全身に痒みを伴うじんましんが現れることがある。

●重度/呼吸困難・血圧低下・意識障害

刺されて数分から数十分の間に息苦しさ、声がれ、激しい動悸やめまいなどを起こすことがあり、進行すると意識を失うこともある。「アナフィラキシー反応」の可能性が高く、処置が遅れると生命の危険を伴う。

ハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要！